

## がん患者服薬情報提供書 (トレーシングレポート)

処方医:	科 先生御机下		<u>報告日</u>	年	月	
患者ID		保険薬局名				
生年月日	大正・昭和・平成・令和 年 月 日	担当薬剤師名				
レジメン		FAX番号				
※この情報を伝	- 伝えることに対して患者または家族の同意を □得た	□得てない	└ が治療上重要だと思われるので	で報告する		
確認日時: 月 日 確認方法: 口来局時 口患者からの問い合わせ ロテレフォンフォロー						
対応者	□本人  □家族	服薬状況	□良好  □不良			
服薬状況 不良理由	□飲み忘れ( 回) □副作用が発現した(いつから: ) □服用・回数の誤り □自分で判断して飲むのをやめた(いつから: ) □その他( )					
疼痛評価(オピオイド使用患者のみ)						
疼痛部位		NRS	最大:	最小:		
レスキュー回数: 平均すると 1 日 回 レスキュー使用後のNRS:						
副作用モニタリング (CTCAE Version 5.0による評価)						
悪心	0:症状がない 1:少し気持ち悪い 2:気持ち悪いのが2~3日続いている 3:気持ち悪くて水分も食事も摂取できず、 経管栄養や高カロリー輸液、入院を要する	嘔吐	0:症状がない 1:治療を要さない軽度の嘔吐 2:静脈内輸液や内科的治療を 3:経管栄養や高カロリー輸液	·要する嘔吐	嘔吐	
合物不振	0:症状がない 1:食欲がない 2:食欲がない期間が2~3日続いている 3:食欲がない期間が1週間以上続いている	口腔粘膜炎	0:症状がない 1:軽度の症状 2:経口摂取に影響のない疼痛 3:高度の痛みがあり、経口摂			
下痢	0:症状がない 1:普段と比べて1日に1~3回排便回数の増加 2:普段と比べて1日に4~6回排便回数の増加 3:普段と比べて7回以上の排便回数の増加	便秘	0:症状がない 1:便秘時に緩下剤を使用 2:定期的に緩下剤を要する持 3:浣腸を要する頑固な便秘	続的症状		
	0:症状がない 1:痺れがあるが日常生活に支障がない 2:痺れにより身の回り以外の動作に支障がある 3:痺れにより日常生活動作に支障がある(例:ボタンがかけられない、ペットボトルの蓋が開けられない)	倦怠感	0:症状がない 1:軽度のだるさがある、また 2:中等度だるさで、日常生活 3:身の回りの日常生活動作を	に一部制限があ		
皮膚障害	0:症状がない 1:軽度の症状があるが日常生活に支障がない 2:中等度の症状により身の回り以外の日常生活動作に支障 がある 3:高度の症状により日常生活動作に支障がある	手足症候群	0:症状がない 1:疼痛を伴わない軽微な皮膚 2:疼痛を伴う皮膚の変化 3:疼痛を伴う高度の皮膚変化		障がある	
味覚障害	0:症状がない 1:食生活の変化を伴わない味覚変化 2:食生活の変化を伴う味覚変化 3:高度の症状により日常生活に支障がある	その他 ( )	症状の詳細(自由記載)			
症状の詳細・ 支持薬使用状 況						
その他						
	口報告内容を電子カルテに取り込み依頼をしました					
病院薬剤師	口医師に報告しました			担当薬剤師		
記入欄			済生会宇都宮病院			