

がんは 2 人に 1 人になる時代


小さなリスクを見逃さない
今を知り、未来を生きる
スクリーニング検査の選択

だ液でわかる 6 種のがんリスク

これまでの研究から、がんにかかることで、ポリアミンをはじめとしただ液中に含まれる代謝物の特徴が変化することが分かっています。サリバチェッカーでは AI（人工知能）を用いて測定、だ液中の代謝物の特徴が、がんの方とがんではない方のどちらに近いかを解析することで、がんのリスクを評価します。

SalivaChecker®


サリバチェッカー



済生会宇都宮病院 健診センター

検査費用
(サリバチェッカー) **¥22,000** (税込)

※ 人間ドックのオプション検査です



死亡原因の上位のがんをカバー

	1位	2位	3位	4位	5位
男性	肺	胃	大腸	膵臓	肝臓
女性	大腸	肺	膵臓	胃	乳房

出典：
国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）

慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究結果をもとに開発、AI（学習モデル）を用いて、がんの早期発見（ステージ0～）が期待できる検査です。

SalivaChecker®

サリバチェッカー

だ液採取前の注意事項

- 妊娠中・授乳中の方
- 発熱など炎症に伴う症状がある方
- 自己免疫性疾患（潰瘍性大腸炎・リウマチ等）を有する方
- ドライマウス・シェーグレン症候群の方
- 検査前の注意事項を守れていない方
- がん治療中（手術・抗がん剤治療・放射線治療）の方、その他疾患による手術を受けた方
- だ液の性状（検査に適さないだ液の場合）によって再提出検査をお願いする場合がございます。

※ その際は当院からご連絡の上、ご自宅へキットを発送いたします。再提出検査の料金につきましては1回目は無償となります。

だ液は午前中に採取してください

※ 下記注意事項を遵守できなかった場合、検査結果に影響を与える可能性があります

検査前日

夜 9 時以降※¹ に

水以外の飲食をしない / 薬を服用しない※²

※¹ 採取の 12 時間前を目安

※² 薬を服用中の方は事前に医師等にご相談ください

検査当日

朝食をとらない / 薬を服用しない

× 朝食 × 薬 × 入れ歯安定剤 × ガム、飴、トローチ

※ 朝の決まった時間に服薬がある方は、事前に主治医へ、だ液を採取する日だけ薬を飲む時間をずらすことが可能かをご確認ください

検査 1 時間前

歯みがきは検査 1 時間前までに済ませる

歯磨きは自宅で済ませてください。

※ 歯磨き粉、マウスウォッシュ可能

× 激しい運動 × 喫煙 × うがい薬

× 出血をとまなうような口腔内の手入れ（歯ブラシ・歯間ブラシ・爪楊枝 など）

検査直前

検査 15 分前に軽く口をゆすぐ

※ 口紅、リップクリームは検査前にふきとる

検査の流れ

【予約に関するお問い合わせ】

受付時間：月～金 13:00～17:00

028-626-4441

01 人間ドック 予約



02 サリバチェッカー 申込



03 受診当日 だ液を採取



04 結果報告



約 2～3 週間後、来院時にお渡し／送付